



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

MÉDICO NEUROLOGISTA

INSTRUÇÕES:

Você receberá do fiscal: um **caderno de questões** e um **cartão de respostas** personalizado.
As páginas do **caderno de questões** estão numeradas sequencialmente e contêm 50 questões.

ATENÇÃO !

- 1 - Verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- 2 - Verifique no verso do **cartão de respostas**, se seu nome, número de inscrição, data de nascimento e cargo para o qual concorre estão corretos.
- 3 - Leia atentamente cada questão e assinale no **cartão de respostas** a opção que a responde corretamente.
- 4 - Observe as recomendações impressas no **cartão de respostas**.
- 5 - Se você precisar de algum esclarecimento solicite a presença do **chefe de local**.
- 6 - Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova, inclusive a marcação do **cartão de respostas**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle o seu tempo**.
- 7 - Após o término da prova, entregue ao fiscal o **cartão de respostas** devidamente **assinado** no verso.


CALENDÁRIO PREVISTO

Divulgação do Gabarito - 04/06/2000

Prazo de Recurso - 05 e 06/06/2000

Dirigir o pedido de revisão ao Coordenador Geral do Concurso e entregá-lo no Protocolo da FMS, Av. Amaral Peixoto, 171, 4º andar - Centro - Niterói.

Obs.: Não serão recebidos recursos em local diverso do acima referido.



Realização

Núcleo de Computação Eletrônica
Universidade Federal do Rio de Janeiro

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

1 - À concepção do Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pelo poder do Estado, corresponde:

- a) uma noção autoritária de política social que bloqueia o direito à livre organização do trabalho em saúde em um contexto de cidadania restrito
- b) uma noção socialista de que a atenção à saúde deve ser estatal em um contexto de cidadania restrito
- c) uma noção centralizadora e vertical de Estado como gestor único das políticas de saúde em um contexto de cidadania regulada
- d) uma noção de Estado de bem-estar em que direitos sociais são elemento essencial em um contexto de cidadania plena

2 - O modelo médico assistencial dominante nos anos 70 caracterizou-se, principalmente, pela oferta de serviços de saúde da seguinte forma:

- a) universal à população brasileira, através da compra de serviços privados por meio do Instituto Nacional da Previdência Social
- b) prioritário às populações urbanas, através da compra de serviços privados por meio das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde
- c) prioritário às populações inseridas no mercado de trabalho formal, através da compra de serviços privados por meio do Instituto Nacional de Previdência Social
- d) universal à população brasileira pelo Ministério da Saúde, complementado através da compra de serviços privados para os trabalhadores inseridos no mercado de trabalho formal

3 - A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília em 1986, apresenta a saúde como:

- a) resultado do acesso do cidadão aos serviços de saúde, tanto preventivos quanto curativos
- b) resultado da organização social da produção, abrangendo diversos aspectos das condições de vida
- c) um completo estado de bem-estar físico, psíquico e social, e não simplesmente a ausência de doença
- d) um estado ótimo de adaptação do indivíduo, entre seu meio ambiente físico e social e suas características psíquicas

4 - A Lei 8.080, sobre o Sistema Único de Saúde, pode ser considerada insatisfatória no seguinte aspecto:

- a) a população está excluída dos fóruns de discussão e decisão, mantidas as antigas estruturas decisórias nas mãos de grupos fechados nos gabinetes do Estado
- b) a estrutura proposta para o SUS termina por manter a antiga dicotomia ações preventivas x ações curativas
- c) a proposta de descentralização é frágil e não permite a quebra da tradição brasileira de centralização de decisões em nível federal
- d) as relações políticas e financeiras do SUS com o chamado sistema de atenção médica supletiva não foram regulamentadas

5 - Segundo a Norma Operacional Básica 96 (NOB) do Ministério da Saúde, gerência é definida como:

- a) a direção de um sistema de saúde municipal, estadual ou nacional
- b) a administração de uma unidade ou órgão de saúde prestador de serviços ao SUS
- c) a administração de uma unidade ou órgão de saúde ou a direção de um sistema de saúde municipalizado
- d) a direção de órgãos coordenadores de atividades de saúde no nível municipal, como a Vigilância Epidemiológica e a Vigilância Sanitária

6 - Segundo a Norma Operacional Básica 96, o Piso de Atenção Básica (PAB) é:

- a) um conjunto de ações de saúde consideradas básicas no nível de atenção primária
- b) um montante financeiro definido por um valor *per capita* multiplicado pela população de cada município
- c) um conjunto de ações de saúde considerado suficiente para ser oferecido gratuitamente à população
- d) um montante financeiro definido por um valor *per capita* multiplicado pela população de cada estado e por este redistribuído aos municípios

7 - A condição essencial para um município obter gestão plena do sistema de saúde municipal é apresentar:

- a) um Conselho Municipal de Saúde organizado
- b) uma rede de prestação de serviços própria, pelo menos nos níveis primário e secundário
- c) um plano de consórcio com municípios vizinhos, para oferecer uma rede de serviços completa à população
- d) uma rede de prestação de serviços própria, pelo menos em no nível primário, podendo conveniar e credenciar os níveis mais complexos

8 - A proposta de estimular a atividade comunitária junto aos serviços de saúde na condução do SUS tem como objetivo explícito:

- a) incrementar a participação e controle social
- b) economizar gastos com recursos humanos
- c) disciplinar, controlar e reprimir a população
- d) economizar gastos com infra-estrutura de saneamento

9 - O enfoque epidemiológico no modelo de atenção à saúde proposto pela Norma Operacional Básica 96 recomenda aos municípios que:

- a) restrinjam as ações de saúde àquelas de cunho estritamente preventivo, pois são muito mais eficazes
- b) identifiquem grupos de risco em cada município, para a eventualidade de ser necessário isolá-los em quarentena
- c) privilegiem as ações de saúde centradas no meio ambiente, na qualidade de vida e na noção de atenção integral à saúde
- d) notifiquem a emergência de epidemias em seu território à Fundação Nacional de Saúde, para que esta proceda a campanhas de imunização

10 - Segundo a Norma Operacional Básica 96, a relação entre os serviços de saúde e a população deve ter, como foco principal, uma ética pautada por:

- a) lógica política vigente em cada município
- b) princípios básicos do código de ética médica
- c) proposta coletiva que transcende o individual
- d) padrões regionais definidos nas constituições estaduais

Neurologista

11 - A alteração que **NÃO** sugere aumento da pressão intracraniana é:

- a) degeneração pigmentar da retina
- b) exsudatos retinianos hemorrágicos
- c) paresia progressiva da abdução do olho
- d) apagamento das margens do disco óptico

12 - Dentre as vantagens da imagem de ressonância magnética sobre a tomografia computadorizada do crânio **NÃO** se inclui a seguinte:

- a) melhor reconhecimento de fraturas lineares do osso temporal
- b) melhor definição e contraste entre substâncias branca e cinzenta
- c) melhor identificação de lesões desmielinizantes na esclerose múltipla
- d) eliminação da radiação ionizante dos procedimentos de neuroimagem

13 - Um indivíduo adulto, normal está realizando um eletroencefalograma. A atividade elétrica nas áreas parietais e occipitais, se ele estiver de olhos fechados, é:

- a) 1 a 3 Hz
- b) 4 a 7 Hz
- c) 8 a 13 Hz
- d) 14 a 25 Hz

14 - A condição que **NÃO** representa fator de risco para o infarto cerebral é:

- a) fumo
- b) hipertensão
- c) fibrilação atrial
- d) hipotireoidismo

15 - A polimialgia reumática está freqüentemente associada a:

- a) lúpus eritematoso sistêmico
- b) tromboangeíte obliterante
- c) artrite reumatóide
- d) arterite temporal

16 - A instalação súbita de hemiparesia direita, disfasia e hemianopsia homônima direita está mais freqüentemente associada à obstrução da seguinte artéria:

- a) basilar
- b) cerebral média
- c) cerebral anterior
- d) coróidea anterior

17- A ruptura do aneurisma da artéria comunicante posterior pode causar lesão do seguinte nervo craniano:

- a) II
- b) III
- c) IV
- d) VI

18 - O tipo de crise que ocorre com mais frequência no adulto é:

- a) tônico-clônica generalizada
- b) ausência generalizada
- c) parcial complexa
- d) jacksoniana

19 - A neuralgia trigeminal sintomática pode ser produzida por várias causas, menos por:

- a) esclerose múltipla
- b) neurinoma do acústico
- c) síndrome de Tolosa-Hunt
- d) aneurisma da artéria basilar

20 - Paciente masculino de 40 anos, etilista crônico, acordou pela manhã com fraqueza na mão direita. O exame neurológico revelou dificuldade da dorsiflexão da mão e punho direitos. A causa mais provável é a lesão do seguinte nervo:

- a) ulnar
- b) radial
- c) axilar
- d) mediano

21 - Um paciente idoso sofreu pequeno trauma craniano, mas desenvolveu progressiva demência em poucas semanas. A causa mais provável é:

- a) hidrocefalia comunicante
- b) hematoma subdural
- c) lesão axonal difusa
- d) fístula dural

22 - A coréia de Sydenham é um quadro reversível que se desenvolve em consequência de:

- a) febre reumática
- b) doença de Binswanger
- c) endocardite bacteriana
- d) lúpus eritematoso sistêmico

23 - O *Schistosoma mansoni* usualmente lesa o sistema nervoso no seguinte sítio:

- a) cérebro
- b) cerebelo
- c) medula espinhal
- d) nervos periféricos

24 - O medicamento mais indicado para tratar a neurocisticercose é:

- a) albendazol
- b) tiabendazol
- c) oxamniquine
- d) anfotericina B

25 - O exame laboratorial que **NÃO** é útil na investigação de demência é:

- a) vitamina B12
- b) pCO₂
- c) VDRL
- d) TSH

26 - A localização de uma encefalite nas regiões temporal média e orbitofrontal é mais consistente com:

- a) Herpes simplex
- b) Varicella zoster
- c) Toxoplasma gondii
- d) Cryptococcus neoformans

27- Hemianopsia bitemporal ocorre mais frequentemente por:

- a) meningioma da asa do esfenóide
- b) glioma do nervo óptico
- c) astrocitoma occipital
- d) adenoma da hipófise

28 - O tumor cerebral mais comum em paciente com AIDS é:

- a) metástase
- b) glioblastoma
- c) linfoma primário
- d) sarcoma de Kaposi

29- A complicação neurológica mais comum na insuficiência renal crônica é:

- a) delírio
- b) demência
- c) convulsões
- d) neuropatia periférica

30 - O déficit de vitamina B12 promove lesões, usualmente, do sistema nervoso na seguinte localização:

- a) cordões laterais e posteriores da medula
- b) gânglios da base
- c) vermis cerebelar
- d) tronco cerebral

31 - As mioclonias são um achado característico da doença de:

- a) Parkinson
- b) Alzheimer
- c) Huntington
- d) Creutzfeldt-Jacob

32 - Esclerose lateral amiotrófica produz alterações eletroneuromiográficas características que incluem:

- a) fibrilações
- b) retardo dos reflexos H
- c) aumento da amplitude dos potenciais de ação
- d) lentificação das velocidades de condução nervosa

33 - A doença de Parkinson se caracteriza pela deficiência de dopamina. Entretanto, para a correção deste distúrbio é utilizada a l-dopa em lugar da dopamina, porque:

- a) l-dopa induz menos náuseas e vômitos que dopamina
- b) l-dopa é mais eficaz nos receptores de dopamina que a própria dopamina
- c) dopamina é prontamente metabolizada a compostos inativos no trato gastrointestinal
- d) dopamina não pode cruzar a barreira hematoencefálica, não agindo no sistema nervoso central

34 - A encefalomielite disseminada aguda é uma doença desmielinizante que se distingue da esclerose múltipla por ser:

- a) monofásica
- b) rapidamente letal
- c) associada a alterações inflamatórias
- d) apresentar pleocitose neutrofílica no líquido

35 - Paciente masculino de 10 anos de idade vem apresentando, há um ano, tiques motores e vocais, coprolalia e copropraxia. Neste caso, é indicado o uso de:

- a) l-dopa
- b) pimozide
- c) biperideno
- d) carbamazepina

36 - Uma paciente de 30 anos, portadora de esclerose múltipla, está apresentando, no último ano, vários episódios de surtos seguidos de remissões. Neste caso, o medicamento mais recomendado é:

- a) prednisona
- b) azatioprina
- c) metotrexate
- d) interferon beta

37 - Paciente feminina, adulta, no primeiro trimestre de gestação, com epilepsia, em uso de altas doses de ácido valpróico, corre o risco de ter um bebê com:

- a) microcefalia
- b) agenesia do corpo caloso
- c) síndrome de Arnold-Chiari
- d) defeitos de fechamento do tubo neural

38 - A deficiência de arilsulfatase A é característica da:

- a) xantomatose cerebrotendínea
- b) leucodistrofia metacromática
- c) doença de Tay-Sachs
- d) doença de Gaucher

39 - Adenoma sebáceo da face é especialmente comum em:

- a) síndrome de Sturge-Weber
- b) ataxia-teleangiectasia
- c) esclerose tuberosa
- d) neurofibromatose

40 - Criança de 6 meses de idade está apresentando espasmos infantis inúmeras vezes por dia. Foi levantada a hipótese diagnóstica de síndrome de West e solicitado um EEG. O achado característico esperado é:

- a) pontas e ondas agudas centrotemporais
- b) disritmia frontotemporal
- c) ponta-onda a 3c/s difusa
- d) hipsarritmia

41 - A condição em que **NÃO** ocorre papiledema é:

- a) trombose do seio sagital
- b) encefalopatia hipertensiva
- c) degeneração hepatolenticular
- d) ingestão excessiva de vitamina A

42 - Paciente feminina de 30 anos desenvolveu sinais e sintomas de lesão bilateral do fascículo longitudinal medial. Seu diagnóstico mais provável é:

- a) botulismo
- b) esclerose múltipla
- c) paralisia supranuclear progressiva
- d) leucoencefalopatia multifocal progressiva

43 - Paciente hipertenso de 60 anos desenvolveu quadro súbito de amaurose fugaz. A localização provável da lesão que causa esta sintomatologia é na artéria:

- a) basilar
- b) cerebral média
- c) carótida interna
- d) cerebral anterior

44 - O reflexo patelar envolve fibras sensitivas que se originam dos seguintes segmentos espinhais:

- a) L2-L3
- b) L4-L5
- c) S1-S2
- d) S3-S4

45 - Paciente masculino de 60 anos vem apresentando há dez anos, severo tremor quando manipula objetos e ao escrever. O restante do exame clínico e neurológico é normal. O melhor medicamento é:

- a) amitríptilina
- b) propranolol
- c) diazepam
- d) l-dopa

46 - Paciente masculino de 50 anos queixa-se de cefaléias diárias nas últimas duas semanas. Ele relata dois episódios diários de dor, um deles ocorrendo sempre no período noturno, despertando-o do sono. A dor é de grande intensidade, localiza-se no lado direito da face e crânio e dura cerca de uma hora. Costuma fazer-se acompanhar de lacrimejamento e hiperemia do olho direito e congestão nasal. O exame neurológico foi normal. O diagnóstico mais provável é:

- a) sinusite etmoidal
- b) cefaléia em salvas
- c) neuralgia atípica da face
- d) glaucoma de ângulo fechado

47 - Paciente feminina de 60 anos, hipertensa, apresentou vários episódios de fraqueza no braço direito e disartria. O exame neurológico era normal, mas uma angiografia cerebral revelou uma estenose de 80% da artéria carótida interna esquerda. A conduta terapêutica mais apropriada neste momento é:

- a) aspirina
- b) heparina
- c) ticlopidina
- d) endarterectomia

48 - Paciente masculino de 60 anos vem apresentando, há dois anos, tremor em repouso, rigidez e bradicinesia. Também foi observada severa hipotensão ortostática, impotência e incontinência urinária. A hipótese diagnóstica mais provável é:

- a) hidrocefalia de pressão normal
- b) doença dos corpos de Lewy
- c) síndrome de Shy-Drager
- d) doença de Parkinson

49 - O achado patológico mais importante na polineuropatia inflamatória aguda (síndrome de Guillain-Barré) é:

- a) desmielinização segmentar
- b) degeneração neurofibrilar
- c) degeneração walleriana
- d) apoptose neuronal

50 - Cataratas, calvície, atrofia testicular, fraqueza e atrofia muscular ocorrem em associação com:

- a) hipotireoidismo
- b) distrofia de Becker
- c) distrofia miotônica
- d) hiperparatireoidismo